

ANTIDEPRESSZÁNS (SSRI) KEZELÉS KIVÁLASZTÁSA ELŐTTI KÉRDŐÍV

Dr. Kopácsi László pszichiáter magánorvos

	igen	nem
1. Terhes-e, vagy van-e esély arra, hogy terhes lehet?		
2. Szoptat-e jelenleg?		
3. Szenved-e laktóz-érzékenységekben?		
4. Szedett-e már valaha szelektív szerotonin újrafelvétel-gátló gyógyszert (citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin), úgy, hogy az szokatlan, vagy allergiás reakciót okozott?		
5. Kórtörténetében szerepel-e mánia, öngyilkosság? (Az antidepresszánsok növelhetik a mániás epizódok, ill. a szuicid gondolatok veszélyét.)		
6. Kórtörténetében szerepel-e vérzési rendellenesség? (Az SSRI-k szedése fokozhatja a vérzési rendellenességek veszélyét, pl. apró bőrvérzések jelenhetnek meg.)		
7. Szedi-e az alábbi gyógyszerek valamelyikét?		
monoaminooxidáz gátlók* (Aurorix, Mocrim; Selegilin, Jumex, Cognitiv - az elmúlt 7-14 napban)		
triciklikus antidepresszánsok* (pl.: Ludiomil, Anafranil)		
SSRI antidepresszánsok* (pl.: fluoxetin, paroxetin, sertralin)		
dohányzásról való leszokást segítő antidepresszáns* (bupropion)		
lítium, triptofán		
antipszichotikumok (pl.: klozapin, quetiapin, risperidon)		
a vérzés kockázatát fokozó gyógyszerek, pl. a véralvadás gátló gyógyszerek (antikoagulánsok: Syncumar); vérlemezke aggregáció gátlók (pl. acetilszalícilsav= aszpirin, tiklopidin, dipiridamol)		
ízületi fájdalom/gyulladás csökkentő szerek (pl.: ibuprofen, ketoprofen)		
erős fájdalomcsillapító (Tramadol*, Contramal*)		
migrén elleni szerek (pl. sumatriptán*: Imigran, Cinie, Illument és más triptánok)		
vérnyomáscsökkentő (metoprolol)		
gyomorfekély gyógyszer (cimetidin)		
malária megelőzésére és kezelésére használt gyógyszerek (meflokin)		
orbáncfű* (Hypericum perforatum) tartalmú készítmények		
8. Májbetegség?		
9. Cukorbetegség (inzulin, antidiabetikus gyógyszerek)? (Az SSRI-k befolyásolhatják a vércukorszint szabályozását és lehetséges, hogy változtatni kell e gyógyszerei adagolásán. Ezért rendszeresen ellenőrizze vércukorszintjét.)		
10. Epilepsziás? (Az SSRI-k növelhetik a rohamok veszélyét.)		
11. Részesül elektrokonvulzív (ECT) kezelésben?		

* szintén a szerotonin szintet növelő szerek.

Név:

Dátum: 2009.